

INFORME FINAL DEL EMBALSE DE SAN LORENZO
AÑO 2007



CONSULTOR:
UTE RED BIOLÓGICA EBRO

Oficinas UTE Madrid: c/ Miguel Menéndez Boneta 2-4, puerta 8
28460 Los Molinos, Madrid TF y FAX 91 855 00 29 E-mail: consultoria@ica1.e.telefonica.net

JULIO 2008

ÍNDICE

	Página
<u>1. INTRODUCCIÓN</u>	1
<u>2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EMBALSE Y DE LA CUENCA VERTIENTE</u>	2
2.1. Ámbito geológico y geográfico	2
2.2. Características morfométricas e hidrológicas	2
2.3. Usos del agua	3
2.4. Registro de zonas protegidas	3
<u>3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS</u>	4
<u>4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL</u>	5
4.1. Características fisicoquímicas de las aguas	5
4.2. Hidroquímica del embalse	7
4.3. Fitoplancton y concentración de clorofila.	8
4.4. Zooplancton	9
<u>5. DIAGNÓSTICO DEL GRADO TRÓFICO</u>	10
<u>6. DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO</u>	11

ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge los resultados de los trabajos realizados en el embalse de San Lorenzo durante los muestreos de 2007 y la interpretación de los mismos, a efectos de proporcionar una referencia que facilite la consulta y explotación de la información obtenida.

En general, se recurre a presentaciones gráficas y sintéticas de la información, acompañadas de un texto conciso, lo que permitirá una consulta ágil y rápida del documento.

En el **Anexo I** se presenta un reportaje fotográfico que refleja el estado del embalse durante el periodo estudiado (verano 2007, correspondiente al año hidrológico 2006-2007).

En apartados sucesivos se comentan los siguientes aspectos:

- Resultados del estudio en el embalse (FASE DE CARACTERIZACIÓN) de todos los aspectos tratados (hidrológicos, fisicoquímicos y biológicos), que culminan en el diagnóstico del grado trófico.
- Clasificación del "Potencial Ecológico", tras la aplicación de los indicadores biológicos y fisicoquímicos propuestos en la Directiva Marco del Agua.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EMBALSE Y DE LA CUENCA VERTIENTE

2.1. Ámbito geográfico y geológico

El embalse de San Lorenzo se sitúa dentro del término municipal de Camarasa, en la provincia de Lleida. Regula las aguas del río Segre.

Respecto a la geología de la zona, el embalse se encuentra entre materiales de la facies Keuper (arcillas versicolores y yesos), del Jurásico indiferenciado (dolomías, calizas, margas y calcarenitas) y del Paleógeno (facies Garum, intercalaciones de calizas lacustres y lignito; y Oligoceno, areniscas y lutitas). Además, se localizan depósitos aluviales de gravas; arenas; limos y arcillas.

2.2. Características morfométricas e hidrológicas

Se trata de un embalse de moderadas dimensiones.

La cuenca vertiente al embalse de San Lorenzo tiene una superficie total de 6845 km².

El embalse tiene una capacidad total de 9,48 hm³. Caracterizado por una profundidad máxima de 25 metros

En el **Cuadro 1** se presentan las características morfométricas del embalse

CUADRO 1

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DEL EMBALSE DE SAN LORENZO

Superficie de la cuenca	6845 ha
Capacidad total N.M.N.	9,48 hm ³
Superficie inundada	147 ha

Se trata de un embalse monomítico de geología calcárea y situado en zona no húmeda de la red principal. En la fecha de realización del muestreo no existe termoclina. El límite inferior de la capa fótica en verano se encuentra alrededor de los 4,09 metros de profundidad.

2.3. Usos del agua

El uso de las aguas del embalse es principalmente el de regadíos y abastecimiento a la población. Asimismo también se usa para uso recreativo (pesca) y la navegación (sin restricciones para el remo, con condiciones poco favorables para la vela, y no es apto para motor) en este embalse.

2.4. Registro de zonas protegidas

El embalse de San Lorenzo forma parte del Registro de Zonas Protegidas elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en contestación al artículo 6 de la Directiva Marco del Agua, en la categoría de zona de captación de agua para consumo humano.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Para acometer la caracterización del embalse se ha ubicado una estación de muestreo en las inmediaciones de la presa.

Se ha realizado una campaña de muestreo el 9 de Agosto de 2007. En esa fecha no hay estratificación térmica en el embalse.







4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1. Características fisicoquímicas de las aguas

De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes apreciaciones:

- La temperatura del agua oscila entre los 20,4 °C – en el fondo- y los 21,6 °C -máximo registrado en superficie-. En el momento del muestreo (Agosto 2007) no existe termoclina.
- El pH del agua en la superficie es de 7,04, siendo un valor neutro. El valor del fondo es muy parecido al anterior, siendo en este caso de 7,05.
- La transparencia del agua registrada en la lectura de disco de Secchi (DS) es de 1,96 metros, lo que supone una profundidad de la capa fótica en torno a 4,09 metros.
- Las condiciones de oxigenación de la columna de agua alcanzan en el muestreo una concentración media de 9,96 mg/L. Los valores máximo y mínimo de concentración de oxígeno en la columna de agua son, respectivamente 10,6 y 9,1 mg/L, que se obtienen en la superficie y en el fondo. No se han detectado condiciones anóxicas (<2 mg O₂/L).
- La conductividad del agua en la superficie es de 291 μS/cm. Mientras que en el fondo es de 288 μS/cm. Alcanza su máximo valor a 6 metros de profundidad, 294 μS/cm.

GRÁFICO 1
PERFILES FÍSICO-QUÍMICOS DEL EMBALSE DE SAN LORENZO



4.2. Hidroquímica del embalse

De los resultados obtenidos en se desprenden las siguientes apreciaciones:

- La concentración de fósforo total en el muestreo es de 17,2 µg/L P.
- La concentración de nitrógeno total (N) en la muestra tomada es de 0,35 mg/L N.
- La concentración de nitratos resultó inferior al límite de detección (1 mg/L NO₃)
- La concentración de amonio resultó inferior al límite de detección (0,1 mg/L NH₄)
- La concentración de sílice en la muestra tomada es de 2,1 mg/L SiO₂.

4.3. Fitoplancton y concentración de clorofila.

En el análisis fitoplancton se han identificado un total de 41 especies, distribuidas en los siguientes grupos taxonómicos:

- 16 Bacillariophyceae
- 13 Chlorophyta
- 4 Chrysophyceae
- 2 Cyanobacteria
- 2 Cryptophyta
- 2 Dynophyta
- 1 Xantophyta
- 1 Conjugatophyceae

La composición y estructura de la comunidad, en el periodo estival de 2007, está caracterizado por la bacilariofícea *Cyclotella ocellata* (Pantocsek), que representa un 19% de la densidad total en la muestra. La especie más destacable respecto a biovolumen es el dinófito *Ceratium hirundinella* (O.F. Müller), con un 16% del biovolumen total.

El grupo de las bacilariofíceas es el que más especies tiene (16), seguido de los clorófitos (13). Los grupos menos representados son los xantófitos y las conjugatofíceas, con una única especie cada uno.

La concentración de clorofila en el muestreo es de 4,7 µg/L.

4.4. Zooplancton

En el análisis de zooplancton de las muestras del embalse de San Lorenzo se han identificado un total de 15 especies, distribuidas en los siguientes grupos taxonómicos:

- 11 Rotifera
- 3 Cladocera
- 1 Copepoda

La estructura y composición de la comunidad de zooplancton se resume en el siguiente cuadro (**Cuadro 2**)

CUADRO 2
 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE ZOOPLANCTON

EMBALSE DE SAN LORENZO		FECHA DE MUESTREO	09/08/2007
		CODIGO PUNTO DE MUESTREO	
PARAMETRO	UNIDAD	SLO I	
PROFUNDIDAD	m	4,5	
DENSIDAD TOTAL	individuos/L	137,6	
BIOMASA TOTAL	µg/L	16,88	
CLASE PREDOMINANTE (DENSIDAD)		ROTIFERA	
individuos/L		128,5	
ESPECIE PREDOMINANTE (DENSIDAD)		<i>Polyathra luminosa</i>	
individuos/L		83,3	
CLASE PREDOMINANTE ZOOPLANCTON (BIOMASA)		CLADOCERA	
µg/L		7,85	
ESPECIE PREDOMINANTE ZOOPLANCTON (BIOMASA)		<i>Bosmina longirostris</i>	
µg/L		6,5	

La composición y estructura de la comunidad, en el periodo estival de 2007, está caracterizada por la alta densidad (93%) del rotífero *Polyathra luminosa* y la biomasa del cladóceros *Bosmina longirostris* (38,5% de la biomasa total). En cuanto a diversidad de especies, el grupo de los rotíferos es el mejor representado, con 11 especies.

5. DIAGNÓSTICO DEL GRADO TRÓFICO

Se han considerado los indicadores especificados en el **Cuadro 3**, estableciéndose el estado trófico global del embalse según la metodología descrita en la sección 5 de la MEMORIA DEL ESTUDIO (pág. 82).

CUADRO 3
 PARÁMETROS INDICADORES Y RANGOS DE ESTADO TRÓFICO

Parámetros Estado Trófico	Ultraoligotrófico	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico	Hipereutrófico
Concentración P (µg/L P)	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
Disco de Secchi (m)	>6	6-3	3-1,5	1,5-0,7	<0,7
Clorofila a (µg/L) en	0-1	1-2,5	2,5-8	8,0-25	>25
TSI	<20	20-40	40-60	60-80	>80
Densidad algal (cel/ml)	<100	100-1000	1000-10000	10000-100000	>100000

En el **Cuadro 4** se incluye el estado trófico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua según la valoración de este estado trófico final.

CUADRO 4
 DIAGNOSTICO DEL ESTADO TROFICO DEL EMBALSE DE SAN LORENZO.

INDICADOR	VALOR	ESTADO TRÓFICO
P TOTAL	17,19	Mesotrófico
CLOROFILA A	4,7	Mesotrófico
DISCO SECCHI	1,96	Mesotrófico
TSI	41,16	Mesotrófico
DENSIDAD ALGAL	2171,8	Mesotrófico
ESTADO TROFICO FINAL	3,00	MESOTROFICO

Atendiendo a los criterios seleccionados, los resultados obtenidos por todos los parámetros (P total, clorofila a, transparencia, índice TSI y densidad algal) clasifican el embalse como mesotrófico. El estado trófico final para el embalse de SAN LORENZO es **MESOTRÓFICO**.

6. DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO

Se han considerando los indicadores especificados en el **Cuadro 5**, estableciéndose el potencial ecológico del embalse según la metodología descrita en la sección 6.3 de la MEMORIA DEL ESTUDIO (pág. 110).

CUADRO 5
 PARÁMETROS Y RANGOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL ECOLÓGICO

Indicador	Elementos	Parámetros	Óptimo	Bueno	Moderado	Deficiente	Malo
Biológico	Fitoplancton	Densidad algal (cel/ml)	<100	100-10 ³	10 ³ -10 ⁴	10 ⁴ -10 ⁵	>10 ⁵
		Biomasa algal, Clorofila a (µg/L)	0-1	1-2,5	2,5-8	8,0-25	>25
		Biovolumen algal (mm ³ /L)	<0,1	0,1-0,5	0,5-2	2-8	>8
INDICADOR BIOLÓGICO (1)			4,2-5	3,4-4,2	2,6-3,4	1,8-2,6	1-1,8
Fisicoquímico	Transparencia	Profundidad Disco de Secchi (m)	>6	3-6	1,5-3	0,7-1,5	<0,7
	Oxigenación	Concentración O ₂ (mg/L O ₂)	>8	8-6	6-4	4-2	<2
	Nutrientes	Concentración de PT (µg/L P)	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
	Elemento combinado	TSI	<20	20-40	40-60	60-80	>80
INDICADOR FISICOQUÍMICO (2)			4-5	3-3,99	<3		

(1) La valoración del indicador biológico se obtiene asignando la calificación del elemento fitoplancton.

(2) La valoración del indicador fisicoquímico se obtiene realizando la media de las puntuaciones obtenidas para los distintos elementos. Si la media de los 4 elementos es igual o superior a 4, se considera que se cumplen las condiciones fisicoquímicas propias del máximo potencial ecológico (MPE). Si se alcanzan o superan los 3 puntos, se considera que las condiciones fisicoquímicas aseguran el funcionamiento del ecosistema (AS.FUN). Si no se alcanzan los 3 puntos, el estado fisicoquímico no asegura el funcionamiento del ecosistema (NO AS.FUN).

En el **Cuadro 6** se incluye el potencial indicado por cada uno de los parámetros e indicadores, así como la catalogación de la masa de agua según el potencial ecológico final.

CUADRO 6
 DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO DEL EMBALSE DE SAN LORENZO.

Indicador	Elementos	Parámetros	Valor	Potencial
Biológico	fitoplancton	Densidad algal (cel/ml)	2171,8	MODERADO
		Clorofila a (µg/L)	4,7	MODERADO
		Biovolumen algal (mm ³ /L)	1,90	MODERADO
INDICADOR BIOLÓGICO			3,00	MODERADO
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi (m)	1,96	MODERADO
	Oxigenación	O ₂ hipolimnética (mg/L O ₂)	9,96	OPTIMO
	Nutrientes	Concentración de P (µg/L P)	17,19	MODERADO
	Elemento combinado	TSI	41,16	MODERADO
INDICADOR FISICOQUÍMICO			3,50	AS-FUN
POTENCIAL ECOLÓGICO			3,00	MODERADO

ANEXO I
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
