Nota de prensa

Ebro Sostenible: mejora del conocimiento y alcanzar el buen estado de las masas de agua

La CHE ha iniciado un nuevo estudio de náyades autóctonas en el curso medio del Ebro, en Castilla y León

- **Los trabajos de prospección y caracterización de las especies: Margaritífera auricularia (en peligro de extinción), Potomida littoralis, Unio mancus y Anodonta anatina se realizarán entre los meses de verano y otoño, entre Orbaneja del Castillo y Valdenoceda**

19 agosto 2022- La Confederación Hidrográfica del Ebro, Organismo autónomo, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), ha iniciado este verano el estudio de caracterización de náyades en el curso medio del Ebro, para conocer la composición, distribución y abundancia de estas especies en el tramo que atraviesa las siguientes localidades de Castilla y León: Orbaneja del Castillo, Escalada, Quintanilla-Escalada, Valdelateja, Pesquera de Ebro, Quintanilla Colina, Villanueva-Rampalay, Tubilleja de Ebro, Tudanca de Ebro, Cidad de Ebro, Manzanedillo, Rioseco, Incillas y Valdenoceda.

En curso medio del Ebro se tiene constancia de la regresión de U. mancus, P. littoralis y A. anatina, y también de la no constancia, en los últimos estudios de prospección, de ejemplares de M. auricularia. Por lo que se van a realizar muestreos en áreas que no habían sido inspeccionadas por las dificultades técnicas de acceso.

Los resultados del estudio servirán de herramienta para la gestión y protección de estas especies. Esta gestión y protección corresponden al Gobierno de Castilla y León y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Resultado del estudio de náyades autóctonas del Ebro en 2021

En noviembre de 2021 concluyó el estudio de prospección de náyades autóctonas en el tramo medio del río Ebro entre las localidades burgalesas de Valdenoceda y Pangusión

(Valle de Tobalina), revelando que en esta zona, en concreto entre Cillaperlata y Mijaraluenga, se encuentra el tramo de mayor densidad de náyades autóctonas de todo el eje del Ebro, lo que lo convierte en una zona idónea para la reintroducción de Margaritífera auricularia, actualmente en situación crítica y en peligro de extinción.

La disminución de estas especies en el río se debe, sobre todo: a la presión antrópica sobre sus hábitats, a la escasa presencia de poblaciones de peces "hospedadores" de sus larvas (Blenios, Salaria fluviatilis), y las especies invasoras almeja asiática (Corbicula fluminea), mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y Sinanodonta woodiana.

La CHE realiza trabajos de caracterización de estas náyades autóctonas en el Ebro desde 2012.

Ebro Sostenible

Esas acciones se integran en los ejes de acción de la CHE definidos para un Ebro Sostenible. En concreto responde al eje 1, mejora del conocimiento de la cuenca, y al eje 3, alcanzar el buen estado de las masas de agua, que agrupa aquellas actuaciones que contribuyen a disponer de un medio hídrico y de sus ecosistemas asociados con condiciones ambientales cada vez mejores.

Ebro Sostenible tiene como objetivo principal dirigir todas las acciones relacionadas con el agua en la cuenca del Ebro hacia un compromiso de desarrollo sostenible. Junto con la mejora del conocimiento y la búsqueda del buen estado de las masas, los otros tres ejes son: la mejora general de la gestión (2), renovación de la visión de la dinámica fluvial (4) y la garantía de los suministros esenciales (5).

. **Síguenos en**